


Traitement biologique des lisiers



Technologie
enzymatique
naturelle

- Liquéfie les lisiers
- Elimine les odeurs
- Améliore la valeur fertilisante des lisiers

MODE D'ACTION

Les bactéries et les enzymes, contenues dans LOBIFLOR LISIERS, fluidifient les lisiers, en dégradant la cellulose, notamment, et en diminuent les odeurs en piégeant l'ammoniac et certains composés soufrés ; LOBIFLOR LISIERS respecte leur valeur fertilisante et accélère la pénétration dans le sol.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Verser directement *LOBIFLOR LISIERS* sur le lisier :

- dans la préfosse la plus éloignée de la fosse en cas de "fosse en bout",
- réparti sur les caillebotis en cas de "caillebotis intégral".

Périodicité du traitement : toutes les 1, 2 ou 3 semaines.

Lisiers très encroûtés : 100 à 200 grammes par mètre cube de croûte, puis 10 à 20 grammes par mètre cube et par semaine jusqu'à l'obtention du résultat recherché, ensuite se conformer au tableau ci-dessous.

Cheptel	Dose d'attaque	Dose d'entretien, au choix		
		toutes les semaines	ou tous les 15 jours	ou toutes les 3 semaines
Reproducteurs :				
- moins de 50	4 000 g	400 g	900 g	1 400 g
- 50 à 150	6 000 g	600 g	1 350 g	2 100 g
- 150 à 300	8 000 g	800 g	1 800 g	2 800 g
- 300 à 500	10 000 g	1 000 g	2 250 g	3 500 g
Porcs gras :				
- moins de 150	2 000 g	200 g	450 g	700 g
- 150 à 300	4 000 g	400 g	900 g	1 400 g
- 300 à 600	6 000 g	600 g	1 350 g	2 100 g
- 600 à 1 000	8 000 g	800 g	1 800 g	2 800 g
- 1 000 à 1 500	10 000 g	1 000 g	2 250 g	3 500 g
Post-sevrage :				
- jusqu'à 150 porcelets	1 400 g	140 g	315 g	490 g
- 150 à 500	2 000 g	200 g	450 g	700 g
- 500 à 1 500	4 000 g	400 g	900 g	1 400 g
- 1 500 à 3 000	6 000 g	600 g	1 350 g	2 100 g
- 3 000 à 5 000	8 000 g	800 g	1 800 g	2 800 g

CARACTERISTIQUES

Aspect : poudre de couleur gris claire, **Densité :** 1, **Présentation :** seau de 5 kg

COMPOSITION

Lithothamnium - Bactéries lyophilisées, non pathogènes - Enzymes - Matières azotées - Substrats carbonés - Oligo-éléments.

Stocker dans l'emballage fermé hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Refermer après usage. Ne pas inhaler, ni avaler. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.